


UH2 | **FMPC**

FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA



Fmpcopy

Yo FmpCopy
(Amg)

📍 **faculte de medecine et de pharmacie**

Les Concours D'accès De Médecine Casa

2019



CONTACTEZ NOUS!

www.facebook.com/FmpCopy



0690104087

N° examen :

CONCOURS D'ACCES 2018-2019
 EPREUVE DE MATHÉMATIQUES

Nom et prénom :

Date de naissance :

CNE:



Le candidat est informé que toute copie ne portant pas le nom du candidat sera éliminée sans possibilité de recours. Le candidat est informé que toute hachure ou marque au stylo du code à barre de cette copie expose à l'élimination systématique de la copie. Le candidat doit s'assurer que cette feuille est bien imprimée recto-verso.

Durée : 30 mn


CONCOURS D'ACCES 2018-2019
 EPREUVE DE MATHÉMATIQUES



Nombre de questions : 5

I- On considère la fonction f définie dans \mathbb{R} .

Les graphiques suivant (C_g et C_h) donnent une partie de la représentation graphique de deux fonctions (g et h), tel que $f = g + h$.



1- répondre par oui ou par non pour les propositions suivantes :

a- $\int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^1 g(x) dx$

b- f est une fonction paire

b- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$

2- Donner le signe de $f'(x)$ pour tout $x \in [0; +1]$

II- Calculer :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{x^2 + x + 1} - x =$$

EMPCOPY
 centre copie Fmpt
 GSM 06 14 18 13 33

NE
RIEN
ECRIRE

III- Calculer :

$$\int_0^2 (2x - 2) e^{x^2 - 2x + 1} dx =$$

IV- Dans l'espace muni d'un repère orthonormé $(o, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ on considère les vecteurs :

$$\vec{u} = a\vec{i} + b\vec{j} + 3\vec{k} \text{ et } \vec{v} = \frac{20}{3}\vec{i} - 8\vec{j} + 4\vec{k}$$

Déterminer les valeurs des nombres réels a et b tels que \vec{u} et \vec{v} soient perpendiculaires.

$a =$

FMP COPY
centre copie Fmpc
GSM 03 14 18 13 33

$b =$

V- Une urne contient : 4 boules vertes, 3 boules rouges, 2 boules noires et une boule blanche.

Les boules sont indiscernables au toucher. On tire 4 boules de l'urne **en même temps**.

Calculer les probabilités P_1, P_2 et P_3 des événements suivants :

L'événement 1 : les 4 boules tirées sont de la même couleur

$P_1:$

L'événement 2 : chaque boule est de couleur différente

$P_2:$

L'événement 3 : 3 boules parmi les quatre tirées sont de la même couleur

$P_3:$

Répondre à cette question en choisissant la lettre correspondant au résultat correcte dans le tableau :

A	B	C	D	E	F	G
0	$\frac{12}{105}$	$\frac{1}{105}$	$\frac{31}{210}$	$\frac{1}{2}$	1	Aucune réponse ne convient

N° examen :

CONCOURS D'ACCES 2018-2019
EPREUVE DE CHIMIE



Nom et prénom :

Date de naissance :

CNE:

Le candidat est informé que toute copie ne portant pas le nom du candidat sera éliminée sans possibilité de recours. Le candidat est informé que toute hachure ou marque au stylo du code à barre de cette copie expose à l'élimination systématique de la copie

Le candidat doit s'assurer que cette feuille est bien imprimée recto-verso

Durée : 30 mn

CONCOURS D'ACCES 2018-2019
EPREUVE DE CHIMIE



Enoncé

On hydrolyse une masse $m = 11,6$ g de l'ester (E) de formule brute $C_nH_{2n}O_2$ et de masse molaire $M = 116 \text{ g.mol}^{-1}$, avec $0,25 \text{ mol}$ d'eau. En fin de réaction, on obtient un mélange d'acide 2-méthylbutanoïque (X) et de méthanol (Y). Après séparation des produits on obtient une masse $m' = 5,1$ g de (X).

On donne : $M(C) = 12 \text{ g.mol}^{-1}$ $M(H) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$ $M(O) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$

1) Calculer n

$n =$

2) Les formules semi-développées de (X) et de (Y) sont : (entourer la bonne réponse)

- | | | |
|----------------------------------|----|-------------------|
| A- $X = CH_3-CH_2-CH(CH_3)-COOH$ | et | $Y = CH_3OH$ |
| B- $X = (CH_3)_2CH-COOH$ | et | $Y = CH_3-CH_2OH$ |
| C- $X = CH_3-CH_2-COOH$ | et | $Y = CH_3OH$ |
| D- $X = CH_3-CH_2-CH_2-COOH$ | et | $Y = CH_3-CH_2OH$ |

3) La formule semi-développée de l'ester (E) est : (entourer la bonne réponse)

- A- $CH_3-CH_2-CH(CH_3)-COOCH_3$
- B- $CH_3-CH_2-CH_2-COOCH_3$
- C- $CH_3-CH_2-CH_2-COOCH_2-CH_3$
- D- $CH_3-CH_2-CH(CH_3)-COOCH_2-CH_3$

4) Donner le nom de l'ester (E)

.....

5) Donner la quantité n de (Y) en mol

$n(Y) =$


FMP COPY
Centre copie Fmpc
GSM 06 14 18 13 33

NE
RIEN
ECRIRE

لا تكتب هنا

6) Calculer la valeur de la constante d'équilibre **K**


K =

7) En déduire le rendement de cette hydrolyse

p =




8) Quel type d'isomérisme possède l'ester (**E**)
.....

9) La formule semi-développée du composé formé lors de la réduction de l'acide (**X**) par LiAlH_4 est :
(Entourer la bonne réponse)




FMP COPY
centre copie Fmpt
GSM 06 14 18 13 33

10) La formule semi-développée du composé formé lors de l'oxydation de l'alcool (**Y**) par KMnO_4 est :
(Entourer la bonne réponse)



N° examen :

CONCOURS D'ACCES 2018-2019
EPREUVE DE PHYSIQUE



Nom et prénom :

Date de naissance :

CNE :


Candidat est informé que toute copie ne portant pas le nom du candidat sera éliminée sans possibilité de recours. Le candidat est informé que toute hachure ou marque au stylo du code à barre de cette copie expose à l'élimination systématique de la copie. Le candidat doit s'assurer que cette feuille est bien imprimée recto-verso. Durée : 30 mn

CONCOURS D'ACCES 2018-2019
EPREUVE DE PHYSIQUE



Exercice 1 :

Une vague se propage à la surface de l'eau suivant une direction Ox. A la date $t=0$, le front de l'onde est en S et à la date $t=3s$, la forme de la surface de l'eau a l'aspect ci-dessous



1. Calculer la célérité de l'onde

$V = \dots\dots\dots \text{m/s}$

2. On considère un point M_2 situé à 12 m de M_1 .

Calculer le retard de l'onde perçue en M_2 par rapport à celle perçue en M_1


$\tau = \dots\dots\dots \text{s}$

Exercice 2 :

La figure suivante représente l'image obtenue sur un écran placé à une distance D derrière une fente de largeur $a = 60 \mu\text{m}$ éclairée par une lumière monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 600 \text{ nm}$.

Sachant que la largeur de la tache centrale est de 2 cm, calculer la distance D qui sépare l'écran de la fente

On considère le cas des angles très petits.



$D = \dots\dots\dots \text{m}$

Exercice 3 :

Sur une piste horizontale, une personne pousse un enfant assis sur un traîneau pour lui communiquer une vitesse initiale $V_0 = 5 \text{ m s}^{-1}$.

La personne lâche ensuite le traîneau en 0, à la date $t = 0$.

La piste exerce une force de frottement \vec{f} constante, opposée au déplacement, de valeur $f = 30 \text{ N}$.

La masse de l'enfant et du traîneau est égale à 60 Kg.

1. Quelle est l'accélération du traîneau

2. A quelle date t le traîneau s'arrête-t-il ?

Quelle distance (d) a-t-il alors parcouru ?



$a_x = \dots\dots\dots \text{m s}^{-2}$

$t = \dots\dots\dots \text{s}$

$d = \dots\dots\dots \text{m}$

NE
RIEN
ECRIRE

لا تكتب هنا


FMP COPY
centre copie Fmpt
GSM 06 14 18 13 33

Exercice 4 :

L'iode 131 radioactif ($^{131}_{53}\text{I}$) se désintègre par émission β^- .

1. Ecrire l'équation de la réaction nucléaire, sachant que le noyau fils se trouve parmi les noyaux

suivants : $_{51}\text{Sb}$, $_{52}\text{Te}$, $_{54}\text{Xe}$, $_{55}\text{Cs}$




2. Combien de temps faut-il attendre pour que 99,9% d'une activité donnée de cet iode ($^{131}_{53}\text{I}$) ait disparu?

$t = \dots \dots \dots$ jours

on donne: Demi-vie de l'iode 131 = 8 jours ; $\frac{\ln 1000}{\ln 2} \approx 10$

Exercice 5 :

On lâche, sans vitesse initiale, du point A d'une trajectoire circulaire \widehat{AB} qui se trouve dans un plan vertical, une balle considérée comme un objet ponctuel. La balle glisse sur cette trajectoire circulaire jusqu'au point B puis quitte \widehat{AB} . Cette portion de trajectoire circulaire AB est reliée à une trajectoire rectiligne BD inclinée d'un angle θ par rapport au plan horizontal.



On néglige les frottements et on prendra $g = 10 \text{ ms}^{-2}$

On donne : $L = BD = 10\text{m}$, $AC = BC = 1,25 \text{ m}$ et $\theta = 45^\circ$

1- Calculer la vitesse V_B de la balle au moment de son passage par le point B.

$V_B = \dots \dots \dots \text{m.s}^{-1}$

En prenant comme repère (B, \vec{i}, \vec{k}) et comme origine des temps le moment où la balle passe par le point B.

$Z = \dots \dots \dots$

2 - Donner l'équation de la trajectoire

3- Déterminer les coordonnées du point de chute M de la balle sur la trajectoire BD.

$X_M = \dots \dots \dots \text{ m}$
 $Z_M = \dots \dots \dots \text{ m}$